

الامراض الشائعة في الأرانب



موقع الدواجن

جميع الحقوق محفوظة لموقع الدواجن ويمنع النسخ او نقل المحتوى بدون إذن خطي من إدارة موقع الدواجن تحت طائلة المسائلة القانونية

موقع الدواجن على العنوان التالي

www.thepoultry.net

أهم الأمراض الشائعة في الأرناب



د. حنان محمد أبوسريع 

تعتبر تربية الأرناب في الآونة الأخيرة بعد ظهور أنفلونزا الطيور من أهم الصناعات والمنتجات في مصر وكثير من الدول العربية.

حيث اتجه لها الكثير من المستهلكين بعد زيادة الوعي بمعرفة قيمتها الغذائية العالية عن كثير من البروتينات الأخرى.

ولكن يوجد في تربية الأرناب بعض الأمراض الخطيرة التي قد تفتك بالمزرعة كاملة إذا لم يتم التعامل معها بكفاءة طبية عالية من حيث:

- 1- إعطاء التحصينات المثلي في أوقاتها المناسبة
- 2- تطهير المزرعة بانتظام
- 3- العزل للأرناب المصابة
- 4- إعطاء العلاج واستمرار العزل حتى انتهاء فترة حضانة المرض

ومن أهم هذه الأمراض

- 1- الجرب (MITES)
- 2- التسمم الدموي النزفي الفيروسي (Viral Haemorrhagic Disease)

مرض الجرب (Mites)

ويعتبر من الأمراض الطفيلية الخارجية (external parasites) وينتقل المرض عن طريق الملامسة مع أرناب مصابة و هو نوعان:

أ- جرب الأذن (ear mites)

الأعراض

التهاب في صوان الأذن واحتكاك شديد مما يسبب قرح مؤلمة في أذن الأرناب ثم يعقبه هزال شديد لامتناع الأرناب عن الأكل.

الوقاية

- 1- النظافة التامة وتطهير المزرعة

- 2- عدم دخول أرانب جديدة على القطيع قبل تمام التأكد من خلوها من المرض أو خروج أرانب مريضه من المزرعة إلى المزارع الأخرى
 - 3- عدم السماح للعمال للتنقل بين المزارع
 - 4- عدم استعمال أدوات مزارع أخرى كان بها المرض
 - 5- وضع مطهرات على باب المزرعة للعمال قبل الدخول للمزرعة وتغيير الملابس قبل الدخول للمزرعة
 - 6- يستخدم الايفوماك 0.2 سم تحت الجلد ويكرر كل شهرين
- العلاج: وضع 2 سم ماء اكسجين 15% في كل أذن والضغط على الأذن لخروج القشور ثم 2 سم جلسرين أو زيت في كل أذن وحقن ايفوماك تحت الجلد ويكرر كل شهرين.

ب- جرب الجسم (fur mites)

الأعراض

قشور بيضاء في منطقة الأنف والفم والأرجل الأمامية وتساقط للشعر ويمتنع الأرنب عن الأكل مما يصيبه بالهزال الشديد ويحدث النفوق في حالة عدم العلاج

الوقاية

- 1- أتباع أساليب النظافة العامة
- 2- حقن الايفوماك 0.2 سم تحت الجلد ويكرر كل شهرين

العلاج

قص الشعر في المنطقة المصابة وغسل المكان المصاب بصابون الكبريت والماء ودهانها بمرهم الكبريت يوميا مع حقن الايفوماك تحت الجلد ويكرر كل شهرين وغسيل البطاريات بمحلول الديازينون شهري

مرض التسمم الدموي النزفي الفيروسي (viral haemorrhagic disease)

يعتبر من الأمراض الفيروسية وأول اكتشافه في الصين عام 1984
الأعراض: نفوق مفاجئ دون أي أعراض ظاهرية ولكن من الممكن أن ترتفع درجة الحرارة إلي 41 درجة مئوية وظهور افرازات دموية من فتحتي الأنف وصراخ و إجهاض للأمهات وتكون الأرانب في عمر شهرين عرضه للمرض

الوقاية والعلاج

- 1- النظافة التامة وتطهير المزرعة.
- 2- عدم دخول أرانب جديدة على القطيع قبل تمام التأكد من خلوها من المرض.
- 3- عدم السماح للعمال للتنقل بين المزارع
- 4- عدم استعمال أدوات مزارع أخرى كان بها المرض.
- 5- وضع مطهرات على باب المزرعة للعمال قبل الدخول وتغيير الملابس قبل الدخول للمزرعة.
- 6- ترك المزارع المصابة لمدة 8 أسابيع وتعقيمها بالفورمالين للتأكد من خلوها من الفيروس.

التحصين

استخدام لقاح ضد مرض التسمم النزفي الدموي الفيروسي وجرعته 0.5 سم لكل أرنب تحت الجلد عند عمر شهرين ويكرر كل 6 شهور.

المراجع:

- 1- كتاب أمراض وطفيليات الأرانب (Domestic Rabbits Diseases and Parasites)
- 2- أمراض الأرانب ((Diseases of Domestic Rabbits)).



جميع الحقوق مسجلة باسم **موقع الدواجن** ويمنع نسخ المقال او وضعها بأي موقع ويسمح بوضع ملخص مع رابط للمقال الأصلي على موقع الدواجن وأي مخالفة ستعرض للمسائلة القانونية

www.thepoultry.net

